

## Résumé du chapitre 20 : Applications géométriques du gradient

Dans tout le chapitre, on se place dans l'espace  $\mathbb{R}^p$  avec  $p = 2$  ou  $3$ , muni de son produit scalaire canonique et de la norme euclidienne associée.

### I - Courbes planes

Dans cette partie,  $p = 2$  et  $\mathbb{R}^2$  sera appelé le plan et on notera  $\mathcal{B}_c = (\vec{i}, \vec{j})$  sa base canonique et  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormé correspondant.

#### I-1. Définition d'une courbe du plan

On peut définir une courbe du plan de plusieurs façons.

- *Graphe d'une application*  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  : ensemble des points  $M(x, g(x))$  pour  $x$  décrivant  $I \subset \mathbb{R}$ .
- *Courbe paramétrée* : ensemble des points  $M(x(t), y(t))$  pour  $t$  décrivant  $I \subset \mathbb{R}$ ,  $x : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ .
- *Courbe définie par une équation cartésienne* : ensemble des points  $M(x, y)$  tels que  $f(x, y) = 0$  avec  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  et  $U \subset \mathbb{R}^2$ .

#### Définition :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$  et  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ . On appelle ligne de niveau de  $f$  l'ensemble des points  $M(x, y)$  tels que  $f(x, y) = k$  avec  $k$  constante réelle.

#### Définitions :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ ,  $\mathcal{C}$  la courbe d'équation cartésienne  $f(x, y) = 0$  et  $M(x_0, y_0)$  un point de  $\mathcal{C}$ .

On dit que  $M$  est un point régulier de  $\mathcal{C}$  si  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ .

Dans le cas contraire ( $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0) = \vec{0}$ ), on dit que  $M$  est un point singulier de  $\mathcal{C}$ .

On dit que la courbe  $\mathcal{C}$  est régulière si tous ses points sont réguliers.

#### Propriété : Paramétrage local de classe $C^1$

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ ,  $\mathcal{C}$  la courbe d'équation cartésienne  $f(x, y) = 0$  et  $M(x_0, y_0)$  un point régulier de  $\mathcal{C}$ .

Il existe un intervalle ouvert  $I \subset \mathbb{R}$  et une fonction  $\vec{\varphi} : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ , de classe  $C^1$  sur  $I$  et telle qu'au voisinage

de  $M(x_0, y_0)$ , la courbe  $\mathcal{C}$  est paramétrée par  $\vec{\varphi}$ , soit 
$$\begin{cases} x(t) = \vec{\varphi}(t) \cdot \vec{i} \\ y(t) = \vec{\varphi}(t) \cdot \vec{j} \end{cases}$$

## I-2. Tangente en un point régulier

Propriété :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ ,  $\mathcal{C}$  la courbe d'équation cartésienne  $f(x, y) = 0$  et  $M(x_0, y_0)$  un point régulier de  $\mathcal{C}$ .

La courbe  $\mathcal{C}$  admet une normale en  $M$  dirigée par  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0)$  et une tangente d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

Propriété :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  et  $\mathcal{C}$  la courbe d'équation  $f(x, y) = 0$ .

En un point régulier  $M(x_0, y_0)$ , le gradient de  $f$  est orienté dans le sens des valeurs croissantes de  $f$ , c'est-à-dire qu'au voisinage de  $t = 0$ ,  $f\left(x_0 + t \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), y_0 + t \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right) - f(x_0, y_0)$  est signe de  $t$ .

## II – Surfaces et courbes de l'espace

Dans cette partie,  $p = 3$  et  $\mathbb{R}^3$  sera appelé l'espace ; on notera  $\mathcal{B}_e = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  sa base canonique et  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  un repère orthonormé correspondant.

### II-1. Définition d'une surface de l'espace

On peut définir une surface de l'espace de plusieurs façons, entre autres par :

- un paramétrage :  $M(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$  avec  $(u, v) \in I \times J \subset \mathbb{R}^2$  et  $x, y, z : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$  ;
- une équation cartésienne :  $M(x, y, z)$  tels que  $f(x, y, z) = 0$  avec  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  et  $U \subset \mathbb{R}^3$ .

Définition : (non mentionnée dans le programme)

Une surface de révolution d'axe  $D$  est une surface  $\mathcal{S}$  dont l'image par une rotation d'axe  $D$  et d'angle non nul modulo  $2\pi$  est elle-même.

Définitions :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^3$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ ,  $\mathcal{S}$  la surface d'équation cartésienne  $f(x, y, z) = 0$  et  $M(x_0, y_0, z_0)$  un point de  $\mathcal{S}$ .

On dit que  $M$  est un point régulier de  $\mathcal{S}$  si  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0, z_0) \neq \vec{0}$ .

Dans le cas contraire ( $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0, z_0) = \vec{0}$ ), on dit que  $M$  est un point singulier de  $\mathcal{S}$ .

On dit que la surface  $\mathcal{S}$  est régulière si tous ses points sont réguliers.

Définitions :

Soit  $U$  un ouvert non vide de  $\mathbb{R}^3$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ ,  $\mathcal{S}$  la surface d'équation cartésienne  $f(x, y, z) = 0$  et  $M(x_0, y_0, z_0)$  un point régulier de  $\mathcal{S}$ .

Le plan passant par  $M(x_0, y_0, z_0)$  et de vecteur normal  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x_0, y_0, z_0)$  est appelé plan tangent à la surface  $\mathcal{S}$  au point  $M$ .

On dit que tout vecteur normal à ce plan est dit normal à la surface en  $M(x_0, y_0, z_0)$ .

## **II-2. Courbes tracées sur une surface**

### Définition :

Si  $\mathcal{S}$  est une surface de l'espace définie par l'équation cartésienne  $f(x, y, z) = 0$ , alors toute courbe vérifiant cette équation (entre autres) est incluse dans  $\mathcal{S}$  et est dite tracée sur la surface  $\mathcal{S}$ .

### Propriété :

Soient  $\mathcal{S}$  une surface d'équation  $f(x, y, z) = 0$ , avec  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  sur  $U$ , ouvert non vide de  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathcal{C}$  une courbe paramétrée par  $\vec{\varphi} : I \rightarrow U ; t \mapsto (x(t), y(t), z(t))$ , avec  $I$  intervalle de  $\mathbb{R}$ , tracée sur  $\mathcal{S}$ , de classe  $C^1$  et régulière. Enfin, soit  $M(x_0, y_0, z_0)$  un point régulier de  $\mathcal{S}$  tel que  $M \in \mathcal{C}$  (donc il existe  $t_0 \in I$  tel que  $\vec{\varphi}(t_0) = \overrightarrow{OM}$ ).

Alors, la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $M$  est incluse dans le plan tangent à  $\mathcal{S}$  en  $M$ .